

# Curaderm-BEC5: Perguntas e Respostas, Uso e Instruções

## Curaderm-BEC5 - Um tratamento eficaz para cânceres de pele *não-melanoma*

**INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:** Este documento responde a algumas perguntas comuns sobre Curaderm-BEC5. Ele não contém todas as informações disponíveis. Não toma o lugar de falar com o seu médico, farmacêutico ou profissional de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre a utilização deste medicamento, por favor consulte o seu profissional de saúde.

### O que Curaderm-BEC5 contém?

Curaderm-BEC5 creme (20g) contém o ingrediente ativo anticancerígeno Glicosídeos Solasodine (BEC). Ele também contém Ácido Salicílico e Uréia em concentrações relativamente elevadas que ajudam BEC a matar células cancerosas. Ácido Salicílico e Uréia podem irritar a pele em alguns indivíduos.

### Para que é Curaderm-BEC5 utilizado?

Este medicamento é utilizado para tratar cânceres de pele não-melanoma: **carcinoma de células basais**, também chamado **carcinoma basocelular (CBC)** e o **carcinoma espinocelular (CEC)**, bem como **ceratoses**.

### O que fazer antes de usar Curaderm-BEC5?

Informe o seu médico ou profissional da saúde se você tem alergia a quaisquer medicamentos, alimentos, conservantes ou drogas. O ingrediente anticancerígeno BEC está presente na berinjela. Se você é alérgico a berinjela, converse com seu médico ou profissional de saúde antes de usar Curaderm-BEC5.

Além disso não use este medicamento se você é:

- \* **Alérgico à aspirina**
- \* **ou menor de 12 anos sem aconselhamento médico**

**NOTA:** Áreas sendo tratadas com Curaderm-BEC5 devem permanecer cobertas com um curativo, tais como micropore. Curaderm-BEC5 **deve ser armazenado abaixo de 25° C, preferivelmente na geladeira**. Manter Fora do Alcance das Crianças.

# Como usar Curaderm-BEC5

- **Converse com seu médico ou profissional da saúde** antes de iniciar o tratamento
- **Lave a área a ser tratada** com sabão e água
- **Permitir área a secar**
- **Lavar as mãos**
- **Abra a parte superior do frasco** Curaderm-BEC5 apenas imediatamente antes da utilização
- **Aplique uma camada FINA** de Curaderm-BEC5 **APENAS na área afetada ou áreas a serem tratadas**. Cuidados devem ser tomados para não aplicar creme Curaderm-BEC5 em áreas não afetadas. **Se excesso de creme é aplicado**, limpe o excesso e depois lave creme Curaderm-BEC5 da área com água e sabão. Curaderm-BEC5 é usado somente para tratar áreas externas da pele. Áreas perto dos olhos ou os lábios devem ser tratadas com muito cuidado. **Não permita que Curaderm-BEC5 entre em seus olhos.**
- A área que você trata com Curaderm-BEC5 **não deve ser maior do que cerca de 2 polegadas por 2 polegadas (2.5cm por 2.5 cm)**, a menos que indicado pelo seu médico.
- **Cobrir a área tratada com uma bandagem hermética** (sem ar), como fita de papel Micropore.
- **Fechar o frasco Curaderm**. Armazenar com segurança o frasco fechado de Curaderm-BEC5 em local fresco (abaixo de 25°C ou 77°F) ou refrigerar.
- Após a aplicação do creme **lavar bem as mãos**.
- **Aplicar Curaderm-BEC5 duas vezes por dia, seguindo as instruções acima.** Deixe o creme sobre a área ou áreas afetadas pelo tempo prescrito pelo seu médico. A duração do tempo que Curaderm-BEC5 é deixado sobre a pele varia e não é o mesma para condições diferentes da pele. Curaderm-BEC5 pode ser aplicado com mais frequência como indicado pelo seu médico ou profissional da saúde.
- **Não utilize** lâmpadas solares ou camas de bronzamento. Evitar a exposição ao sol, tanto quanto possível durante o tratamento com Curaderm-BEC5.
- Certifique-se de **manter fora do alcance de crianças e animais domésticos**.

## Como Aplicar:



# Dúvidas

## Quantas vezes?

Curaderm-BEC5 deve ser utilizado, pelo menos, duas vezes por dia, mas pode também ser utilizado até dez vezes por dia dependendo do tipo de lesão a ser tratada. Por favor, fale com seu médico ou profissional de saúde para diretrizes de uso em aplicações mais frequentes. É importante **sempre cobrir a área tratada** com um pano ou papel especial, como Micropore, que é uma marca de fita de papel. **NÃO permita a área a ser tratada a secar.**

## O que esperar?

Na maioria dos casos, algum grau de vermelhidão, coceira, descamação da pele, inchaço e alguma drenagem será observada durante o tratamento. Formigamento ou queimação pode ser sentido por 30 a 60 minutos após cada aplicação. Esta é uma reação normal. O seguinte padrão de reações pode ser antecipado: **Primeiro vermelhidão**, em seguida **geralmente erosão e ulceração** seguido por um **novo crescimento do tecido da pele normal**. *Durante o tratamento* a lesão pode parecer pior do que antes do tratamento. *Durante o tratamento e até que o tecido novo tenha crescido*, sua pele na área de tratamento vai ficar visivelmente diferente da pele normal.

## Por quanto tempo usá-lo?

Quando a pele tratada aparecer normal, o tratamento deve ser interrompido. Os tempos de tratamento nos ensaios clínicos foram 8 semanas e 12 semanas. Os tempos de tratamento irão variar dependendo do tipo e tamanho da lesão sendo tratada. Ocasionalmente, pode ser necessário prolongar o regime de tratamento. Em caso de dúvida, é melhor tratar a área por um período prolongado a fim de evitar a re-ocorrência. Neste caso, o tratamento deve continuar até ao momento em que a lesão foi substituída por um tecido novo.

**É importante garantir um regime de tratamento normal. Vários tratamentos ignorados pode resultar no crescimento de pele normal ao longo do topo da lesão. Isto pode resultar em mascaramento e, assim, o tratamento incompleto da lesão.**

**Reações adversas: Dor excessiva, inchaço, vermelhidão ou drenagem purulenta (pus), febre e outras preocupações devem ser comunicadas ao seu médico ou profissional de saúde.**

**Renúncia:** Curaderm-BEC5 não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Estas declarações não foram avaliadas pelo FDA americano. Informações em nosso site são fornecidas apenas para fins informativos e não pretendem substituir o conselho fornecido pelo seu próprio médico ou profissional de saúde. Você não deve usar a informação contida aqui para diagnosticar ou tratar um problema de saúde ou doença, ou prescrever medicamentos.

# Informações Importantes do Fabricante

**Se o creme Curaderm BEC5 está aguado ou está saindo transparente**, ele não está danificado, mas separado devido às altas temperaturas.

Ele pode ser reconstituído de volta ao normal como espuma de novo e ainda é 100% eficaz!

1. Coloque seu tubo de Curaderm num pequeno recipiente de água quente a 60-70 graus Celsius durante aproximadamente 5 minutos.
  2. Remova e agite vigorosamente à mão. Você será capaz de ouvir o líquido quando agitando o tubo como sendo água. Continue a agitar até que você pare de ouvir a solução aquosa tremendo por dentro.
  3. Coloque o tubo imediatamente no congelador por 15-20 minutos.
  4. Em seguida, guarde na geladeira pronto para uso.
- Isto irá assegurar que seu tubo de Curaderm estará misturado novamente e funcionando 100%, efetivo como novo.*